

Sigmoideoskopi vejledning

Sigmoideoskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og den nederste del af tyktarmen.

Den udføres med en bøjelig kikkert, som indføres via endetarmen.

Det er muligt at tage vævsprøver fra tarmslimhinden og fjerne små polypper. Undersøgelsen er kortvarig ca 10 minutter og kan være forbundet med forbigående ubehag (og smerter).

OBS - DU SKAL RINGE TIL OS HVIS: Du får Marcoumar eller Marevan (blodfortyndende medicin). Du skal da have taget en blodprøve (INRværdi) højst 3 dage før undersøgelsen. Hvis du selv måler INR, skal værdien være under 3 og højst 3 dage gammel.

Du skal ikke holde pause med din blodfortyndende medicin.

Undersøgelsen er meget sikker og medfører kun yderst sjældent risiko for blødning eller hul på tarmen.

I forbindelse med vævsprøver eller fjernelse af polypper kan der optræde mindre blødning fra endetarmen.

Ved svære mavesmerter, feber eller blødning fra tarmen skal der søges læge med det samme.

Forberedelse

Du skal ikke være fastende.

For at opnå et godt undersøgelsesresultat skal tyktarmen være udtømt.

Udtømningsvejledning

Vedlagte udtømningsmiddel Toilax/Dulcolax bedes benyttet således: Dagen før undersøgelsen Kl. 12.00 Skal du tage 2 stk. Toilax / Dulcolax tabletter. Kl. 22.00 Skal du tage 2 stk. Toilax / Dulcolax tabletter.

OBS: Toilax/Dulcolax kan give mavekneb og kvalme.

På undersøgelsesdagen Ca. 2 timer før mødetidspunktet tages den medsendte tube Microlax/Glyoktyl

Den er lettest at tage Microlax/Glyoktyl, når du ligger ned. Spidsen på tuben føres helt op i endetarmen og tømmes. Pas på ikke at slippe presset om tuben, da væsken så suges ud igen.

Den virker som regel efter få minutter, og virkningen kan strække sig over de næste 30 minutter.

Kirurgisk Klinik Bispensgade 10, 2.sal. 9000 Aalborg Telefon 98162255 www.kikkert-aalborg.dk